

いきいき直売の会 防除日誌

アスパラガス

出荷予定日の1週間前までに管轄支所へ提出してください。

提出必須品目:野菜類(きのこ類・山菜類含む)・果実類・野菜苗

農薬は適正に使用・正確に報告。農薬を使用しない場合も 防除日誌提出。



出荷予定日		月 日		提出日		月 日	
支所名	氏 名			会員番号			
栽培品目/品種名	アスパラガス /			圃場所在地			
播種日	月 日		定植日	月 日		収穫予定日	月 日
出荷店舗 (○で囲む)	JAグリーン ハッピータウン サンコー マックスバリュ 大阪屋 みのりの番屋 アルビス プラファ						

農薬散布(○印) 有 無				※農薬を使用した場合は、必ず記載してください。						
農薬名		希釈倍率 (使用量)	使用時期 (収穫前)	使用回数	使用月日					対象病害虫
					月/日	月/日	月/日	月/日	月/日	
殺虫剤	ダントツ水溶剤	2000～4000倍	前日まで	3回	/	/	/			アブラムシ類、 ネギアザミウマ他
	ランネット45DF	1000倍	前日まで	1回	/					ネギアザミウマ
	モスピラン水溶剤	4000倍	前日まで	2回	/	/				アブラムシ類、コナジラミ類、 アザミウマ類
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
殺菌剤	Zボルドー	500倍	—	—	/	/	/	/	/	茎枯病
	ジマンダイセン水和剤	400～600倍 (500倍)	収穫終了後、 但し秋期まで	6回	/	/	/	/	/	茎枯病、褐斑病 (斑点病)
	ベンレート水和剤	2000倍	前日まで	4回	/	/	/	/		茎枯病、株腐病
	トップジンM水和剤	1000倍	7日前まで	5回	/	/	/	/	/	茎枯病、立枯病
	ダコニール1000	1000倍	前日まで	3回	/	/	/			茎枯病、斑点病、 褐斑病、疫病
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
除草剤など					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	

JA支所営農指導員 確認日・印		本所営農販売課 確認日・印		特記事項
令和 年 月 日		令和 年 月 日		