

# いきいき直売の会 防除日誌

# ハクサイ

出荷予定日の1週間前までに管轄支所へ提出してください。

提出必須品目:野菜類(きのこ類・山菜類含む)・果実類・野菜苗

農薬は適正に使用・正確に報告。農薬を使用しない場合も 防除日誌提出。



出荷予定日	月	日	提出日	月	日
-------	---	---	-----	---	---

支所名	氏名	会員番号
-----	----	------

栽培品目/品種名	ハクサイ /	圃場所在地
----------	--------	-------

播種日	月	日	定植日	月	日	収穫予定日	月	日
-----	---	---	-----	---	---	-------	---	---

出荷店舗 (○で囲む)	JAグリーン	ハッピータウン	サンコー	マックスバリュ	大阪屋	みのりの番屋	アルビス	プラファ
----------------	--------	---------	------	---------	-----	--------	------	------

農薬散布(○印)		有	無	※農薬を使用した場合は、必ず記載してください。						
農薬名	希釈倍率 (使用量)	使用時期 (収穫前)	使用回数	使用月日					対象病害虫	
				月/日	月/日	月/日	月/日	月/日		
殺虫剤	ダイアジノン粒剤5	4kg/10a	播種時又は定植時	1回	/					ケラ、ネキリムシ類、コガネムシ類幼虫
	オルトラン水和剤	1500倍 (1500~2000倍)	30日前まで	1回	/					カブラハバチ、ヨウムシ、ハスモンヨトウ(アオムシ、コナガ)、アブラムシ類
	ランネート45DF	1000~2000倍	14日前まで	2回	/	/				アオムシ、コナガ、ヨウムシ、アブラムシ類
	モスピラン水溶剤	1000~2000倍 (2000~4000倍)	14日前まで	3回	/	/	/			コナガ、アオムシ(アブラムシ類)
	アフアーム乳剤	1000~2000倍	7日前まで	3回	/	/	/			コナガ、アオムシ、ヨウムシ
					/	/	/	/	/	
殺菌剤	Zボルドー	500倍	-	-	/	/	/	/	/	軟腐病
	ジマンダイセン水和剤	600倍	30日前まで	1回	/					べと病、白斑病、黒斑病
	ベンレート水和剤	2000~3000倍	7日前まで	2回	/	/				白斑病
	トップジンM水和剤	1500倍	7日前まで	2回	/	/				白斑病
	ネビジン粉剤	20~30kg/10a	播種又は定植前	1回	/					根こぶ病
					/	/	/	/	/	
除草剤など					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	

特記事項
------

JA支所営農指導員 確認日・印	本所営農販売課 確認日・印
令和 年 月 日	令和 年 月 日