

いきいき直売の会 防除日誌

キュウリ

出荷予定日の1週間前までに管轄支所へ提出してください。

提出必須品目:野菜類(きのこ類・山菜類含む)・果実類・野菜苗

農薬は適正に使用・正確に報告。農薬を使用しない場合も 防除日誌提出。



出荷予定日		月 日		提出日		月 日	
支所名	氏 名			会員番号			
栽培品目/品種名		キュウリ /			圃場所在地		
播種日	月 日		定植日	月 日		収穫予定日	月 日
出荷店舗 (○で囲む)	JAグリーン ハッピータウン サンコー マックスバリュ 大阪屋 みのりの番屋 アルビス プラファ						

農薬散布(○印) 有 無				※農薬を使用した場合は、必ず記載してください。						
農薬名		希釈倍率 (使用量)	使用時期 (収穫前)	使用回数	使用月日					対象病害虫
					月/日	月/日	月/日	月/日	月/日	
殺虫剤	オルトラン粒剤	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時	1回	/					アブラムシ類、アブラムシ類、オンツコナジラミ
	モスピラン水溶剤	2000倍 (2000～4000倍)	前日まで	3回	/	/	/			コナジラミ類、(アブラムシ類、アサミウマ類)
	ダイアジノン粒剤5	4～6kg/10a	播種時又は定植時	2回	/	/				コガネムシ類幼虫、ケラ、ネキリムシ類、タネバエ
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
殺菌剤	Zボルドー	500倍	—	—	/	/	/	/	/	斑点細菌病、べと病
	ジマンダイセン水和剤	600倍 (600～800倍)	前日まで	3回	/	/	/			炭疽病、疫病、つる枯病(べと病)
	ベンレート水和剤	2000～3000倍	前日まで	3回	/	/	/			菌核病、灰色かび病、つる枯病
	トップジンM水和剤	1500～2000倍	前日まで	5回	/	/	/	/	/	灰色かび病
	アリエッティ水和剤	400～800倍	前日まで	3回	/	/	/			べと病
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
除草剤など					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	

JA支所営農指導員 確認日・印		本所営農販売課 確認日・印		特記事項
令和 年 月 日		令和 年 月 日		