氷見市マコモタケ組合
氷見市農協営農販売課
高岡農林振興センター氷見班

2023 年９月

マコモタケ栽培管理情報 −4号−

今後は、マコモの活力を維持させるため間断かん水を徹底し、適期収穫に努めましょう。

１　水管理

・ほ場が乾きすぎるとマコモの肥大や品質が低下するため、間断かん水を行いましょう。
・ほ場が軟弱な場合は、作業性を考えて徐々に落水管理を行い、土壌を固めましょう。

２　害虫防除

・害虫が見られたら、早めに防除を行いましょう。昨年、被害が多くみられたほ場は、特に注意してください。

ニカメイチュウの被害 ①
茎が変色し、オガクズのようなフンが出ている。

ニカメイチュウの被害 ②
ニカメイチュウは、マコモタケを食害します。

ホソミドリウンカ
体長約６ｍｍ。集団でいる。

害虫名	農薬名	10aあたり散布量	備考
ニカメイチュウ	サブリナフロアブル	100～300ℓ(希釈倍数:1,000 倍) (薬液 100mℓ/水 100ℓ)	収穫前日まで
ホソミドリウンカ	粘着くん液剤	300ℓ(希釈倍数:100 倍) (薬液1ℓ/水 100ℓ)	収穫前日まで
	ボタニガード ES	300ℓ(希釈倍数:500 倍) (薬液 200mℓ/水 100ℓ)	―

※パダン粒剤は、収穫前日数の関係から使用不可

３　イノシシ対策

・収穫時期にイノシシの食害を受けないよう、電気柵を設置していないほ場は、早急に張りましょう。

４　収穫時期

・気温が高い日が続く予報ですので、９月中旬から定期的にほ場を確認し、収穫の目安（表）を参考に適期収穫に努めましょう。

ふくらみはじめ
（まだ早い）

収穫適期

収穫遅れ
（外皮の緑化）

表　気温と収穫時期の関係(目安)

連続５日 25℃以下起点日	収穫開始時期	収穫盛期目安
８月 10 日	９月 17 日	**９月 25 日**
８月 20 日	９月 18 日	**10 月３日**
８月 30 日	９月 20 日	**10 月 10 日**
９月 10 日	９月 21 日	**10 月 19 日**

連続５日 25℃以下起点日:氷見のアメダスの平均気温が 25℃以下の日が連続５日続いた初日を示す。