

# りんご栽培情報第1号

令和2年3月10日  
氷見市りんご組合  
J A 氷見市  
富山県高岡農林振興センター

## ■1 概況・・・ふじの開花始めは平年よりやや早い

本年のりんごの生育は平年よりやや早く、富山県農林水産総合技術センター園芸研究所果樹研究センターによる、3月6日時点の開花予想日は下表の通りです。これらを目安に防除作業を進めましょう。なお、今後3月下旬までは高温が予想され開花時期は大きく変動する可能性がありますので、今後の生育状況に注意して下さい。

品種名	開花始め	前年値	平年値
王林	4月14日頃	4月18日	4月17日
ふじ	4月20日頃	4月23日	4月23日

## ■2 今後の病害虫防除

回数	時期	対象病害虫	散布薬剤名	希釈倍数	10a当 散布量	100㎡当 必要薬剤(g, cc)	防除実施日 (自己記入)
1	3月23~25日頃	ハダニ類	トモノールS	100倍	300ℓ	1ℓ	月 日
2	4月3~5日頃	黒星病 ハマキムシ類	アントラコール顆粒水和剤 ダーズバンDF	500倍 3,000倍	400ℓ	200g 33g	月 日
3	4月13~15日頃 (開花直前)	黴、黴、根黴、黴、黴、 展着剤	アスパイア水和剤 マイリノー	500倍 20,000倍	500ℓ	200g 5cc	月 日

※開花直前の防除については、生育状況をこまめに観察し、生育ステージに合わせて防除を行ってください。農薬散布の際は、園外への飛散や他作物にかからないように十分注意して下さい。

## ■3 せん定の見直し

園地によってはまだ枝が込み過ぎているところがあります。このままでは病害虫の発生源になりますので、薬剤の通りが良くなるようにもう一度せん定の見直しを行なってください。

## ■4 いぼ皮削りについて

枝に輪紋病の感染源の「いぼ皮」が目立つほ場では、果実への感染が懸念されるので、粗皮削りを徹底し「いぼ皮」を除去します。赤衣病による枯れた枝を確認したら切除、または表面を削り取りとります。「いぼ皮」や赤衣病の病斑を削った個所には保護塗布剤を塗って下さい。

## ■5 二年枝の摘花について

二年枝(昨年伸びた枝)のえき芽についている花芽(えき花芽)は、摘花して着果させないようにしましょう。「こうたろう」はえき花芽が多く着生しますので、摘花を徹底して下さい。