## 2024年 いきいき直売の会 アスパラガス(立茎栽培)病害虫防除暦(案)

月	旬	生育	殺菌剤	倍率	殺虫剤	倍率	葉面散布剤	除草剤 1a当り使用量 水100当り	適用病害 虫
4	中下	萌芽前	ここまで耕種的防除					トレファノサイド乳剤	
			病気が多発なら					20~30m I 、1回のみ	
			<u>①ベンレート水和剤</u>	2, 000倍				(雑草がまばらに生え ている場合は、バスタ 液剤(使用回数2回) を混用散布する)	
5	上	春どり盛期							
	中				アーデント水和剤	1, 000倍			オオタバコガ、 アブラムシ、カ
					(前日まで、2回以内)				メムシ類
	下	立茎始め	①ベンレート水和剤 (前日まで、4回以内)	2, 000倍	- 古井明仏 <b>小</b> で叶吟去物			センコル水和剤 10~15g、1回のみ	疫病
			②アミスター20 (F) <u>※</u>	2,000倍	<u>立茎開始から防除を徹</u> <u>底する。3日間隔で実</u> <u>施。1mの高さまで。</u>			(萌芽前散布) 散布時萌芽しているもの は収穫販売しない	茎枯病、斑点 病、褐斑病
		立茎中期	③ダコニール1000(液) (前日まで、4回以内)	1, 000倍	<u>それ以降は1週間間</u> <u>隔。</u>				茎枯病、斑点 病、褐斑病
		立茎完了	④コサイド3000 (DF)	2,000倍					茎枯病、斑点 病、褐斑病
			(使用回数制限なし)						
6	上	茎葉伸長期	ダコニール1000(液)	1,000倍	ハチハチフロアブル	1,000倍			茎枯病、斑点 病、褐斑病、ア ブラムシ、アザ
			(前日まで、4回以内)	2 0004	(前日まで、2回以内)	2 0004	- メリット青 500倍		ミウマ類 茎枯病、斑点
	中	開花・擬葉展開	アフェットフロアブル (前日まで、4回以内)	2,000倍	アファーム(乳) (前日まで、2回以内)	2,000倍			病、褐斑病、ア ブラムシ、アザ <u>ミウマ類</u> 茎枯病、斑点
	下		アミスター20 (F) ※ (前日まで、4回以内)	2, 000倍					病、褐斑病
7	上	夏どり始め	<b>シグナムWDG</b> (前日まで、2回以内)	1, 500倍	モスピラン(顆粒水) (前日まで、2回以内)	4, 000倍	根っこリン   250倍   カルタス   500倍   (病害虫防   除薬剤に混		茎枯病、斑点 病、褐斑病、ア ブラムシ、アザ ミウマ類
	中		コサイド3000 (DF) (使用回数制限なし)	2,000倍					茎枯病、斑点 病、褐斑病
	下		ダコニール1000(液)	1, 000倍	デルフィン顆粒水和剤	1000倍	用散布す		茎枯病、斑点 病、褐斑病、ョ
			(前日まで、4回以内)		(前日まで、―)		る)		トウムシ、オオ タバコガ
8	中	夏どり盛期 (※)	<u>アフェットフロアブル</u> (前日まで、4回以内)	2, 000倍	<u>ダントツ(水溶)</u> (前日まで、3回以内)	2,000~4000倍		バスタ液剤 30~50m I 、2回以内 雑草生育期萌芽前又は うね間処理	茎枯病、斑点 病、褐斑病、ョ トウムシ、オオ
				 4, 000倍	コテツフロアブル	2, 000倍			タバコガ ヨトウムシ、オ オタバコガ、カ
			<u>ラリー水和剤</u> (前日まで、2回以内)	.,	(前日まで、2回以内)	_, 。。,			メムシ類
	下				スピノエース(顆粒水)	5, 000倍			
					(前日まで、2回以内)			(収穫前日まで)	茎枯病、斑点
			<u>コサイド3000(DF)</u> (使用回数制限なし)	2, 000 <del>倍</del>					病、褐斑病
9	上	夏どり後半	ダコ 二一ル1000(液) (前日まで、4回以内)	1,000倍	フェニックス顆粒水和剤 (前日まで、2回以内)	2,000~4,000倍	250倍		茎枯病、斑点 病、褐斑病、ヨ トウムシ、オオ タバコガ
	中		コサイド3000 (DF)	2, 000倍	ハチハチフロアブル	1, 000倍	カルタス 500倍		茎枯病、斑点 病、褐斑病、ア
			(使用回数制限なし)		(前日まで、2回以内)	,	(病害虫防 除薬剤に混		ブラムシ、アザ <u>ミウマ類</u> 茎枯病、斑点
	下		アフェットフロアブル (前日まで、4回以内)	2, 000倍	アーデント水和剤 (前日まで、2回以内)	1,000倍	用散布する)		を他柄、斑点 病、褐斑病、オ オタバコガ、ア ブラムシ
10	上	打ち止め	ベルクート水和剤 (収穫終了後、5回以内)	1, 000倍				プリグロックスL 60~100m I 、3回以内	茎枯病
	中	養分転流時期	ICボルド―66 (収穫終了後)	50倍				(収穫前日まで)	茎枯病
<b>7</b> 44.	記事で				ı	I		1	

## 【特記事項】

※アミスター20(F)には、展着剤は加用しない。

※8月下旬頃からの長雨による病害虫発生に備え、8月上旬からの防除を徹底する。

害虫対策	薬剤名	使用量	使用時期
カタツムリ類、ナメクジ類	スラゴ	1~5g/m³	発生時