

水稻情報

— 第8号 —

てんたかくの茎数は平年並み、葉齢は1枚早く推移しており、幼穂形成期*は平年よりやや早い6月22日頃と予想されます。

コシヒカリは茎数がやや多く、富富富は茎数がやや少なく推移していますが、いずれの品種も中干しの適期となっています。

※幼穂長が2mm
になる頃

- 1 中干しが終了したほ場から、「間断かん水」に移行しましょう。
- 2 ほ場を見回り、雑草が見られたら除草剤を散布しましょう。

具体的なデータ

6月18日の調査結果

		田植日 (月/日)	草丈 (cm)	茎数 (本/m ²)	葉齢 (葉)	葉色 (葉色板)
てんたかく	本年	5/5	44.4	575	11.3	4.5
	平年	5/3	44.2	566	10.3	4.5
コシヒカリ	本年	5/15	36.1	444	9.2	4.2
	平年	5/14	38.0	386	9.2	4.3
富富富	本年	5/18	33.2	311	9.1	4.5
	平年	5/12	33.7	437	8.9	4.5

一度に強く干し上げるのではなく、徐々に固めましょう。



富富富1経営体1調査ほ調査に参加された指定ほ場を近日中に巡回します。そちらのコメントもご確認ください。