

水稲情報

1 「てんたかく」

穂揃期を迎えています。

稲体の活力を維持するため、収穫7日前まで土壌水分を切らさないよう管理しましょう。

2 「コシヒカリ」

肥効調節型肥料を施用したほ場でも、葉耳間長±0cmの時期に、葉色が4.0以下のほ場では、走り穂の時期までに追肥しましょう。

足跡に水が残る程度の湿潤状態を維持しましょう。

--- 詳しくは稲作情報 第6号 参照 ---

具体的なデータ

7月17日の調査結果

	田植日 (月/日)	草丈 (cm)	茎数 (本/m ²)	葉齢 (葉)	葉色 (葉色板)	幼穂形成期	出穂期
てんたかく	本年 5/5	-	-	-	-	6/24	7/16
	平年 5/3	-	-	-	-	6/24	7/16
コシヒカリ	本年 5/15	82.3	491	13.1	3.8	7/10	(7/31)
	平年 5/14	78.5	425	12.9	3.9	7/11	8/1
富富富	本年 5/18	75.5	464	13.2	4.3	7/15	(8/5)
	平年 5/12	70.9	517	12.4	4.1	7/10	8/2

平年、「てんたかく」では、出穂後35日目頃に成熟期を迎えます

このような干し過ぎは厳禁

