

# いきいき直売の会 防除日誌

# ジャガイモ

出荷予定日の1週間前までに管轄支所へ提出してください。

提出必須品目:野菜類(きのこ類・山菜類含む)・果実類・野菜苗

農薬は適正に使用・正確に報告。農薬を使用しない場合も 防除日誌提出。



出荷予定日	月	日	提出日	月	日
-------	---	---	-----	---	---

支所名	氏名	会員番号						
栽培品目/品種名	ジャガイモ /	圃場所在地						
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫予定日	月	日

出荷店舗 (○で囲む)	JAグリーン	ハッピータウン	サンコー	マックスバリュ	大阪屋	みのりの番屋	アルビス	プラファ
----------------	--------	---------	------	---------	-----	--------	------	------

農薬散布(○印)		有	無	※農薬を使用した場合は、必ず記載してください。						
農薬名	希釈倍率 (使用量)	使用時期 (収穫前)	使用回数	使用月日					対象病害虫	
				月/日	月/日	月/日	月/日	月/日		
殺虫剤	オルトラン粒剤	3~6kg/10a (1~2g/株)	植付時	1回	/					アブラムシ類
	オルトラン水和剤	1000~1500倍	30日前まで	2回	/	/				アブラムシ類
	ランネート45DF	1000~2000倍	7日前まで	5回	/	/	/	/	/	アブラムシ類
	モスピラン水溶剤	2000~6000倍	7日前まで	3回	/	/	/			アブラムシ類
	ダイアジノン粒剤5	4~6kg/10a	植付前	1回	/					ケラ、ネキリムシ類
					/	/	/	/	/	
殺菌剤	Zボルドー	500倍 (400倍)	—	—	/	/	/	/	/	軟腐病 (疫病)
	ジマンダイセン水和剤	400~600倍	7日前まで	10回	/	/	/	/	/	疫病
	ベンレート水和剤	種いも重の0.3 ~0.4%	植付前	1回	/					黒あざ病
	ネビジン粉剤	30kg/10a	植付時	1回	/					そうか病
	ダコニール1000	500~1000倍	7日前まで	5回	/	/	/	/	/	疫病
					/	/	/	/	/	
除草剤など					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	

特記事項

JA支所営農指導員 確認日・印	本所営農販売課 確認日・印
令和 年 月 日	令和 年 月 日