

# いきいき直売の会 防除日誌

# キャベツ

出荷予定日の1週間前までに管轄支所へ提出してください。

提出必須品目: 野菜類(きのこ類・山菜類含む)・果実類・野菜苗

農薬は適正に使用・正確に報告。農薬を使用しない場合も 防除日誌提出。



出荷予定日	月	日	提出日	月	日
-------	---	---	-----	---	---

支所名	氏名	会員番号						
栽培品目/品種名	キャベツ /	圃場所在地						
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫予定日	月	日

出荷店舗 (○で囲む)	JAグリーン	ハッピータウン	サンコー	マックスバリュ	大阪屋	みのりの番屋	アルビス	プラファ
----------------	--------	---------	------	---------	-----	--------	------	------

農薬散布(○印)		有	無	※農薬を使用した場合は、必ず記載してください。						
農薬名	希釈倍率 (使用量)	使用時期 (収穫前)	使用回数	使用月日					対象病害虫	
				月/日	月/日	月/日	月/日	月/日		
殺虫剤	ダイアジノン粒剤5	4~6kg/10a (6kg/10a)	播種時又は出芽時(定植時)	2回 (1回)	/	/				ケラ、ネキリムシ類 (ネキリムシ)
	オルトラン水和剤	1000~1500倍 (1000~2000倍)	30日前まで	1回	/					ヨトウムシ、ハスモンヨトウ (アオムシ、コナガ、アブラムシ類)
	ランネート45DF	1000~2000倍	14日前まで	3回	/	/	/			アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、アブラムシ類
	モスピラン水溶剤	1000~2000倍 (2000~4000倍)	7日前まで	5回	/	/	/	/	/	コナガ、アオムシ (アブラムシ類、アザミウマ類)
	アフアーム乳剤	1000~2000倍	前日まで	3回	/	/	/			コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ等
					/	/	/	/	/	
殺菌剤	Zボルドー	500倍	-	-	/	/	/	/	/	軟腐病、黒腐病、べと病
	ジマンダイセン水和剤	400~600倍	30日前まで	3回	/	/	/			べと病
	ネビジン粉剤	20~30kg/10a	播種又は定植前	2回	/	/				根こぶ病
	ダコニール1000	1000倍	14日前まで	2回	/	/				べと病
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
除草剤など					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	

特記事項
------

JA支所営農指導員 確認日・印	本所営農販売課 確認日・印
令和 年 月 日	令和 年 月 日