

いきいき直売の会 防除日誌

ナス



出荷予定日の1週間前までに管轄支所へ提出してください。

提出必須品目:野菜類(きのこ類・山菜類含む)・果実類・野菜苗

農薬は適正に使用・正確に報告。農薬を使用しない場合も 防除日誌提出。

出荷予定日	月	日	提出日	月	日
-------	---	---	-----	---	---

支所名	氏名	会員番号
-----	----	------

栽培品目/品種名	ナス /	圃場所在地
----------	------	-------

播種日	月	日	定植日	月	日	収穫予定日	月	日
-----	---	---	-----	---	---	-------	---	---

出荷店舗 (○で囲む)	JAグリーン	ハッピータウン	サンコー	マックスバリュ	大阪屋	みのりの番屋	アルビス	プラファ
----------------	--------	---------	------	---------	-----	--------	------	------

農薬散布(○印)		有	無	※農薬を使用した場合は、必ず記載してください。					対象病害虫	
農薬名	希釈倍率 (使用量)	使用時期 (収穫前)	使用回数	使用月日						
				月/日	月/日	月/日	月/日	月/日		
殺虫剤	ダントツ水溶剤	2000~4000倍 (2000倍)	前日まで	3回	/	/	/			アブラムシ類、コナジラミ類 マメハモグリバエ(ミナミキイロアザミウマ、ハモグリバエ類)
	モスピラン水溶剤	4000倍 (2000~4000倍)	前日まで	3回	/	/	/			アブラムシ類 (アザミウマ類)
	ダイアジノン粒剤5	4~6kg/10a	播種時又は定植時(収穫開始3日前まで)	2回 (3回)	/	/	/			ケラ、ネキリムシ類 (コガネムシ類幼虫)
	ピラニカEW	2000~3000倍	前日まで	1回	/					チャノホコリダニ、 ハダニ類
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
殺菌剤	トップジンM水和剤	1500~2000倍	前日まで	5回	/	/	/	/	/	灰色かび病、菌核病
	ベンレート水和剤	2000~3000倍	前日まで	3回	/	/	/			灰色かび病
	ダコニール1000	1000倍	前日まで	4回	/	/	/	/		黒枯病、灰色かび病、 すすかび病
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
除草剤など					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	

JA支所営農指導員 確認日・印	本所営農販売課 確認日・印
令和 年 月 日	令和 年 月 日

特記事項
