いきいき直売の会　防除日誌

サツマイモ

出荷予定日の1週間前までに管轄支所へ提出してください。
提出必須品目：野菜類(きのこ類・山菜類含む)・果実類・野菜苗
農薬は適正に使用・正確に報告。農薬を使用しない場合も　防除日誌提出。

出荷予定日	月　　日	提出日	月　　日

支所名		氏　名		会員番号	
栽培品目/品種名	サツマイモ　　／			圃場所在地	
播種日	月　　日	定植日	月　　日	収穫予定日	月　　日

出荷店舗（〇で囲む）	JAグリーン　ﾊｯﾋﾟｰﾀｳﾝ　サンコー　ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ　大阪屋　みのりの番屋　アルビス　プラファ

農薬散布(〇印)　　有　　無　※農薬を使用した場合は、必ず記載してください。

	農薬名	希釈倍率（使用量）	使用時期（収穫前）	使用回数	使用月日					対象病害虫
					月/日	月/日	月/日	月/日	月/日	
殺虫剤	ダントツ粒剤	6～9kg/10a	植付前～植付時	1回	/					コガネムシ類
	ランネート45DF	1000～2000倍	7日前まで	5回	/	/	/	/	/	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ
	ダイアジノン粒剤5	4～6kg/10a	植付前（30日前まで）	1回（3回）	/	/	/			ケラ、ネキリムシ類（コガネムシ類幼虫）
	フォース粒剤	9kg/10a	植付前	1回	/					ハリガネムシ類、コガネムシ類幼虫
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
殺菌剤	トップジンM水和剤	200～500倍	植付前（20～30分間種いも又は苗茎部浸漬）	1回	/					黒斑病
	ベンレート水和剤	500～1000倍	植付前（20～30分間苗茎部浸漬）	1回	/					つる割病、黒斑病
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
除草剤など					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	

JA支所営農指導員　確認日・印		本所営農販売課　確認日・印	
令和　年　月　日		令和　年　月　日	

特記事項