

いきいき直売の会 防除日誌

タマネギ

出荷予定日の1週間前までに管轄支所へ提出してください。

提出必須品目:野菜類(きのこ類・山菜類含む)・果実類・野菜苗

農薬は適正に使用・正確に報告。農薬を使用しない場合も 防除日誌提出。



出荷予定日		月 日		提出日		月 日	
支所名	氏 名			会員番号			
栽培品目/品種名		タマネギ /			圃場所在地		
播種日	月 日		定植日	月 日		収穫予定日	月 日
出荷店舗 (○で囲む)	JAグリーン ハッピータウン サンコー マックスバリュ 大阪屋 みのりの番屋 アルビス プラファ						

農薬散布(○印) 有 無				※農薬を使用した場合は、必ず記載してください。						
農薬名	希釈倍率 (使用量)	使用時期 (収穫前)	使用回数	使用月日					対象病害虫	
				月/日	月/日	月/日	月/日	月/日		
殺虫剤	オルトラン水和剤	1000~1500倍	21日前まで	5回	/	/	/	/	/	ネギアザミウマ
	ランネート45DF	1000~2000倍	7日前まで	4回	/	/	/	/		ネギアザミウマ
	モスピラン水溶剤	2000倍	7日前まで	3回	/	/	/			アザミウマ類
	ダイアジノン粒剤5	4~6kg/10a (3~5kg/10a)	30日前まで (播種時又は定植時)	2回	/	/				コガネムシ類幼虫 (タネバエ、タマネギバエ、ケラ)
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
殺菌剤	ジマンダイセン水和剤	400~600倍 (400~500類)	3日前まで	5回	/	/	/	/	/	べと病、さび病、黒斑病、 灰色腐敗病、灰色かび病等
	ダコニール1000	1000倍	7日前まで	6回	/	/	/	/	/	べと病、灰色かび病
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
除草剤など					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	

JA支所営農指導員 確認日・印	本所営農販売課 確認日・印
令和 年 月 日	令和 年 月 日

特記事項
