2023年 アスパラガス(立茎栽培) 栽培こよみ

◆病害虫防除暦

月	旬	生育	殺菌剤	倍率	殺虫剤	倍率	葉面散布剤	除草剤 1a当り使用量 水100当り	適用病害 虫
	_	萌芽前	ここまで耕種的防除					トレファノサイド乳剤	
4	中下		病気が多発なら						
			<u>①ベンレート水和剤</u>	2,000倍				20~30m I 、1回のみ	
	ㅗ	春どり盛期							
	中				アーデント水和剤	1,000倍			オオタバコガ、アブラムシ、カ
				2 000/#	(前日まで、2回以内)				メムシ類
_		立茎始め	①ベンレート水和剤 (前日まで、4回以内)	2, 000倍					疫病
5			②アミスター20 (F) ※	2, 000倍	立茎開始から防除を徹底				茎枯病、斑点 病、褐斑病
	下				<u>する。3日間隔で実施。</u> - <u>1 mの高さまで。それ以</u>				
	·	立茎中期	③ ダコニール1000(液) (前日まで、4回以内)	1, 000倍	<u>降は1週間間隔。</u> —				茎枯病、斑点 病、褐斑病
		立茎完了	<u>④コサイド3000 (DF)</u>	2, 000 倍					茎枯病、斑点 病、褐斑病
		* * / F # 1	(使用回数制限なし)	1 000/#		1 000/#			茎枯病、斑点
	上	茎葉伸長期	ダコ ニール1000(液) (前日まで、4回以内)	1, 000倍	ハチハチフロアブル (前日まで、2回以内)	1,000倍			病、褐斑病、ア ブラムシ、アザ
			アフェットフロアブル	2,000倍	アファーム(乳)	2, 000倍			ミウマ類 茎枯病、斑点 病、褐斑病、ア
6	4	即龙。塅赉 展即	(前日まで、4回以内)	,	(前日まで、2回以内)	,			ブラムシ、アザ ミウマ類
	下	開花・擬葉展開	アミスター20 (F) ※ (前日まで、4回以内)	2,000倍			メリット青 500倍		茎枯病、斑点 病、褐斑病
	上	夏どり始め	シグナムWDG (前日まで、2回以内)	1, 500倍	モスピラン(顆粒水) (前日まで、2回以内)	4, 000倍	根っこリン 250倍 カルタス)倍	茎枯病、斑点 病、褐斑病、ア ブラムシ、アザ ミウマ類
7	中		コサイド3000 (DF) (使用回数制限なし)	2,000倍			500倍 (病害虫防) 除薬剤に混 用散布す る)	茎枯病、斑点病、褐斑病	
	下		ダコニール1000(液)	1, 000倍	デルフィン顆粒水和剤	1000倍			茎枯病、斑点 病、褐斑病、ョ トウムシ、オオ
			(前日まで、4回以内)	0.000/±	(前日まで、 <u></u>)	0.000 4000#			タバコガ 茎枯病、斑点
	上	_ _ 夏どり盛期 (※)	<u>アフェットフロアブル</u> (前日まで、4回以内)	2,000倍	<u>ダントツ(水溶)</u> (前日まで、3回以内)	2,000~4000倍			病、褐斑病、ョ トウムシ、オオ
			ラリー水和剤	 4, 000倍	コテツフロアブル	2, 000倍		バスタ 液剤	タバコガ ヨトウムシ、オ オタバコガ、カ
8	毌		<u>フラーパ和別</u> (前日まで、2回以内)	,	(前日まで、2回以内)	,		30~50m I 、2回以内	メムシ類
o					スピノエース(顆粒水)	5, 000倍		雑草生育期萌芽前又は うね間処理	
	下			0.000#	(前日まで、2回以内)			(収穫前日まで)	茎枯病、斑点
			<u>コサイド3000 (DF)</u> (使用回数制限なし)	2, 000倍					病、褐斑病
	上		ダコニール1000(液)	1, 000倍	フェニックス顆粒水和剤	2,000~4,000倍	根っこりん 250倍		茎枯病、斑点 病、褐斑病、ョ トウムシ、オオ
		 	(前日まで、4回以内)	 2, 000倍	(前日まで、2回以内) ハチハチフロアブル	1,000倍	カルタス		タバコガ 茎枯病、斑点
9	中	夏どり後半	コサイド3000 (DF) (使用回数制限なし)	2, 0001百	(前日まで、2回以内)	1,000百	500倍 (病害虫防		病、褐斑病、ア ブラムシ、アザ ミウマ類
	-		アフェットフロアブル	2,000倍	アーデント水和剤	1, 000倍	除薬剤に混 用散布す		茎枯病、斑点 病、褐斑病、オ
	下		(前日まで、4回以内)		(前日まで、2回以内)		る)		オタバコガ、ア ブラムシ
10	上	打ち止め	ベフラン液剤25 (収穫終了時、5回以内)	1,000倍				プリグロックス L 60~100m I 、3回以内 (収穫前日まで)	茎枯病
	-	養分転流時期	ICボルド―66 (収穫終了後)	100倍			人名英巴口 ま	(水管別口まじ)	茎枯病

【特記事項】

※アミスター20(F)には、展着剤は加用しない。 ※除草剤「センコル水和剤」は取り扱い中止となりました。 ※8月下旬頃からの長雨による病害虫発生に備え、8月上旬からの防除を徹底する。

害虫対策	薬剤名	使用量	使用時期	
カタツムリ類、ナメクジ類	スラゴ	1 ~ 5g/m³	発生時	

◆施肥設計

定植時の施肥基準 (kg/100㎡)

						(K g / 100 III /	
肥料名	総量	基肥		追肥			
11C14141		全層	植え溝	6月上	7月上	8月上	9月上
完熟堆肥	1 t	600	400				
苦土石灰(※)	18	12	6				
BMようりん(※)	6	3	3				
鮮菜200	4.5	4.5					
果さい一発	6	6					
やさい燐加安S540	0.6			0.15	0.15	0.15	0.15

2年目以降のの施肥基準 (kg/100㎡)

肥料名	総量	春肥え	基肥	追肥			
1074石			(立茎前)	7月上	7月中	8月上	8月中
完熟堆肥	300	300					
苦土石灰(※)	10	10					
BMようりん(※)	6	6					
鮮菜200	12	12					
NKグリーン30	10.5		2.5	2	2	2	2