

いきいき直売の会 令和5年 すもも(プラム・プルーン)栽培暦

月	時期	対象病害虫	散布薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	年間使用回数	重点作業
1							
2	上 中 下	(発芽前) ふくろみ病 カイガラムシ類	トレノックスフロアブル トモノールS	500倍 20倍	14日前まで 発芽前	3回以内 -	
3	上	(発芽直前) アブラムシ類 黒班病 灰星病	アディオフロアブル Zボルドー ロブラール(水)	1500倍 500倍 1500倍	前日まで 休眠期 前日まで	2回以内 - 3回以内	
	下	(落弁期) 灰星病 黒班病	ベルコート(水) マイコシールド	2000倍 2000倍	3日前まで 21日前まで	3回以内 3回以内	
4	上	カイガラムシ類(幼虫)	アプロードフロアブル	1000倍	14日前まで	2回以内	
	下	アブラムシ類 黒班病	ウララDF マイコシールド	2000倍 2000倍	7日前まで 21日前まで	2回以内 3回以内	
5	上	カイガラムシ類 シンクイムシ類	モベントフロアブル モスピラン顆粒(溶)	2000倍 4000倍	7日前まで 前日まで	3回以内 3回以内	
	下	灰星病	スコア顆粒(水)	2000倍	前日まで	2回以内	
6	中	灰星病	インダーフロアブル	5000倍	前日まで	4回以内	
		シンクイムシ類	スカウトフロアブル	2000倍	前日まで	3回以内	
7	中	灰星病	ベルコート(水)	2000倍	3日前まで	3回以内	
		シンクイムシ類	アディオフロアブル	1500倍	前日まで	2回以内	
8	中	カイガラムシ類(幼虫)	アプロードフロアブル	1000倍	14日前まで	2回以内	
9							
10		黒班病	ICボルドー412	30倍	-	-	
11							
12							

※すももには、プラム(日本すもも)とプルーン(西洋すもも)があり、上記こよみは両種に対応しています。

成木における施肥例(kg/1a)

肥料の種類	総量	基肥	追肥	礼肥
		11~12月	3月	8~9月
BM有機果樹専用	9	9		
果樹専用1号	5		3	2
苦土石灰	12	12		

※1~3年生は上記の2割程度、4~6年生は上記の6割程度とする。

土づくり 基準設計(kg/1a) 10月~12月

肥料の種類	施用量
完熟堆肥	200
BMようりん	6
FTE	0.6

※定植年(植付前)は、上記肥料に加え苦土石灰14kgを施用する。