

花き部会員各位

令和5年7月11日  
いきいき直売の会事務局

## 切花トウガラシ・ハイビスカス・ソリダコを栽培中の方へ

今年度、皆様に苗を供給した上記品目について、7/5 数力所の圃場を巡回し生育状況を確認しました。

今回、摘芯されていない株が多く拝見され、これから摘芯を実施することの是非が分からなかったため、種苗メーカー（フクカエン種苗）に画像を送り、回答を得ましたので参考にして頂きますようお願い致します。

担当：JA 氷見市営農販売課 濱下 TEL:74-8861

### ○トウガラシ コニカルシリーズ

#### 種苗メーカーの回答：

（氷見市窪の圃場の株は）すでに主茎の果実ができてしまっているので、摘心時期としては遅く、摘芯を実施したとしても、これからの側枝の生育が期待できない。

摘心をせずにそのままにしておいた方が良いのではないか。

写真の圃場の株は草丈 30～40cm程度と短いですが、摘心は花がついた時期（発蕾期）に実施すべきで、この時期であれば側枝が 60～70cm 以上になっていないといけない。

⇒定植後に摘芯を実施せず、主茎の実が発生している場合は、今から無理に摘芯を実施せず、整枝（細くて短い側枝を中心に側枝を切除する）のみ実施して 4～5 本仕立て（主茎 1 本、側枝 3～4 本）にしてください。

◆コニカルシリーズ 氷見市産の生産者圃場 7/5 の生育状況

下記写真では摘芯を実施していますが、摘芯の適期を過ぎています。

皆様の株もこのような状態であれば、摘芯は行わず整枝のみ行ってください。



①中央の主茎には果実が発生し、側枝が10本以上発生していました。



②中央の緑色の丸い玉がトウガラシの果実です。



③ハサミを用い、果実の下で主茎を切除了しました(摘芯)。



④細くて短い側枝を中心に手で折り取り、側枝4本のみ残しました(整枝)。



⑤4本仕立て完了後

○トウガラシ カメレオン 氷見市産の生産者圃場 7/5 の生育状況

種苗メーカーの回答：

カメレオンは側枝の伸長が良い品種なので、これから摘芯を実施した場合でも、側枝の生育が期待できる。

ただ、主茎が立派に発生しているはずで、主茎を摘芯して切除してしまうのはもったいないような気がする。

⇒「摘芯を実施した株」と「摘芯を実施しなかった株」の2パターンで栽培し、どちらの結果が良かったかを見て頂くことをご提案します。

整枝はどちらの場合でも実施してください。



①側枝も主茎並みに発達し 10 本以上発生。草丈は 60cm程度に生育していました。



②見分けが付きにくいですが、中央の一番太い茎が主茎です。



③ハサミで主茎を切除しました (摘芯)。



④細くて短い側枝を中心にハサミで切り取り、側枝 4 本のみ残しました (整枝)。



⑤4本仕立て完了後  
側枝が倒れないように支柱を4本立てヒモで支えました。

### 切花トウガラシの摘心時期と位置について



切花トウガラシを上手に作るために・・・

◎摘心は主茎のつぼみが発生したとき(定植後3週間後を目安)に実施する。

◎摘心後、側枝が10本以上発生するので整枝し、3~4本仕立てとする。



①摘心を実施していない場合、このような草姿になっているかと思えます。



②主茎の摘心を行いました。



③摘心後



④定植後に摘心を実施した株。側枝が5本程度発生しています。理想は7~8本

フクカエンの栽培マニュアルには、「摘心をすることにより側枝数が多くなり、草丈も1~1.2mほどに短く抑えることができる。1株当たり7~8本の側枝を得るには、苗の葉数が10枚前後の頃に摘心して先端を止める」とあります。

⇒摘心していない場合は、早めの実施してください。摘心後、側枝が発生しますので、整枝して1株当たり7~8本に仕立ててください。

整枝後は、倒伏防止に支柱やヒモで支えをしてください(フラワーネットを設置していない場合)。

## ○ソリダコ

種苗メーカーの回答：

ソリダコの本格収穫は定植 2～3 年目からで、定植年は株養生を主眼に置いて管理する。  
従って、1 年目は、株養生のための葉を多めに残して収穫する。  
(氷見市余川の圃場の)無摘芯栽培の株は、思ったより丈が長いので、70cm の切り花を切って、15cm くらいの茎と葉が残れば大丈夫かと思う。

⇒富山県栽培マニュアルには下記の記述があります。

①摘芯する場合は定植してから 3～4 週間後に下葉を 5～6 枚残して生長点付近を確実に摘芯する。②摘芯後、側枝が 5～10cm に伸びたところに、生育の中庸な側枝を 1 株当たり 2～3 本残す。③据え置き栽培(無摘芯栽培)も同じく生育の揃った茎を 2～3 本/株に整理する。

無摘芯で栽培された場合は、収穫時は地際から切除するのではなく、15 cm くらいの茎と葉を残すこと。

摘芯した場合は、摘芯位置より上で収穫し、摘芯位置より下の葉と茎を残すことが重要です。

◆ソリダコ 氷見市余川の生産者圃場 7/5 の生育状況

摘芯を実施しなかった株



①無摘芯栽培のソリダコ。草丈 80～90cm以上。収穫の際は、15cm程度、下部の茎と葉を残す。



②地際から30～40cm程度は葉のない状態になっている。生育の段階で雨風等の影響で痛んで枯れたものと思われる。

◆ソリダコ 氷見市宮田の生産者圃場 7/8 の生育状況

草丈 30cm程度のころ(5月中旬)に摘芯を実施した株



①摘芯後、側枝が1ヶ所当たり(3～4株当たり)15～20本以上発生しています。



②整枝を実施し、1ヶ所当たり(3～4株当たり)10本程度に仕立てました。

マニュアルには、3～4本/株とありますのでこの程度が適正であると考えますが、現在、種苗メーカーに確認中です。7/19目揃え会でお答えします。