

富山県野菜推奨品種一覧表（令和5年度）

作目	作型	適品種*	は種期 (月旬)	定植期 (月旬)	収穫(月旬)		
					始	盛	終
トマト	ハウス半促成	CF桃太郎ファイト、桃太郎ワンダー、麗月	1 上 中	3下～4上	5 下	6 中	7 下
	トンネル早熟	ハウス桃太郎、麗夏、りんか409	1下～2上	4 中 下	6 中	7上中	8 上
	普通 (雨よけを含む)	麗月、りんか409、桃太郎8、麗夏	2中～3中	4下～5上	6 下	7下～8上	10 下
	ハウス抑制	CF桃太郎ファイト、桃太郎セレクト	6 上 中	8 上	9中下	10 上	11 上
ミディトマト	トマトに準ずる	華クイン、華小町、フルティカ	-	-	-	-	-
ミニトマト	トマトに準ずる	CF千果、アイコ、ピンキー	-	-	-	-	-
きゅうり	ハウス半促成	兼備2号、ニーナ、新聖、シルフィーパワー2号	1上～3上	2中～4上	3 下	5 中	7 上
	トンネル早熟	VR夏すずみ、ターキーグリーン	3 中 下	4 下	5 中	～	8 上
	普通	VR夏すずみ、シャキット、ターキーグリーン	4 上 中	5 上 中	6 上	～	9 下
	ハウス抑制	兼備2号、フレスコ100、ズバリ163	7 上 中	8 上	8 下	～	11 下
なす	トンネル早熟	千両2号、千両	1中～2上	4 中 下	5 下	7 中	9 下
	普通	千両2号、水なす、筑陽、浅漬け一番	2 上 中	5 上	6 中	7 下	10 下
ピーマン	トンネル早熟	ベルホープ	1 下	4 下	5 下	7 中	9 下
	普通	京まつり、京みどり、京波	2下～3上	5 中 下	7 上	7 下	9 下
かぼちゃ	トンネル早熟	ほっこり133	3下～4中	4下～5上	7 上	7 中	8 中
	普通	味平、くりゆたか、坊ちゃん(ミニ)	4 上 中	5 上 中	7 下	8 上	8 下
	抑制	栗五郎	7中～8中	-	10 下	～	12 上
すいか	ハウス半促成	縞王マックスKE	2 下	4 上	7 上	～	7 中
	トンネル早熟	羅皇、紅まくら(まくら型)、ニュー赤こだま、ニューこだま(黄)	3 中	4 下	7 中	～	8 中
ハウスメロン	半促成	アールスロイヤル夏系	3 中 下	4 中 下	7 中	～	8 上
	普通	アールスロイヤル夏系、アールスナイト夏系2号	4中～5上	5中～6上	8 中	～	9 上
	抑制	アールス雅春秋系、アールスロイヤル夏系、アールスナイト夏系2号	6下～7中	7中～8上	10 上	～	11 中
露地メロン	トンネル早熟	(ネット) サンライズ、アムス、アンデス (まくわ) 銀泉	3 中 下	4 中 下	6 下	～	8 中
いちご	トンネル早熟	宝交早生	-	9下～10上	5 中	～	6 下
	普通	宝交早生、つぶろまん	-	9下～10上	5 下	～	7 上
	促成	紅ほっぺ、かおり野、よつばし	-	9 下	12 中	～	5 下
白ねぎ	春まき(夏秋どり)	夏扇パワー、夏山一本太、源翠、ホワイトスター	2上～3中	4中～5下	8 中	9 中	10 中
	春まき(秋冬どり)	夏扇4号、関羽一本太、源翠	セルCP苗3下～4中 地床苗3下～4中	5上～6上 5下～6下	9 中 9 中	10 下 11 上	12 下 12 下
	春まき(春どり)	春川おく太・1M、吉晴、羽緑一本太(5中～5下まき)	4上～4中	6中～6下	4 下	～	5 中
	秋まき(夏どり)	羽緑一本太	9上～9下	10中～11上	6 下	～	7 下
	ハウスねぎ(冬どり)	{ ①(12～2中どり)ホワイトスター、龍ひかり1号 ②(2下～3月どり)羽緑一本太	4下～6上	6上～7中	12 上	～	3 上
	坊主不知	清心	5中～6上(仮植)	9 中	5 中	～	6 上
青ねぎ	春まき	緑秀、金長、鴨頭	3中～5中	-	5 中	～	7 上
	初夏まき(雨よけ)	緑秀、金長	5上～8下	-	7 中	～	11 中
	秋まき	黒泉冬用	9 中 下	-	4 中	～	5 下
ほうれんそう	春まき	ハンター、ミラージュ、晩抽サンホープ	3中～5上	-	5 上 中	～	6 上
	夏まき (雨よけ)	{ ①ジャスティス、晩抽サンホープ、サンホープセブン ②ミラージュ	5中～6下 7上～8中	- -	6 中 8 上	～ ～	7 下 9 下
	秋まき	ミラージュ、タフスカイ、ドンキー、ハンター	8下～9下	-	9 下	～	11 中
	秋まき(施設)	ゴードン、福兵衛、トラッド7、クロノス	10上～11上	-	11 下	～	2 上
	晩秋まき(露地)	トラッド7、クロノス	10下～11上	-	3 下	～	4 中
	寒締め(施設)	スーパービジョン、弁天丸(10月中旬の播種に限る)(播業種)、雪美菜(縮業種)	10上～10中	-	12 下	～	2 上
キャベツ	春まき	初恋、恋舞、若女将、アーリーボール(丸球)	3中～4上	4中～5中	6 下	～	7 下
	夏まき(9～10月どり)	藍天、初秋	6下～7上	7下～8上	9 下	～	10 中
	夏まき(10～11月どり)	新藍、初恋、ふゆみつ	7中～7下	8上～8下	10 下	～	11 下
	秋まき(5月どり)	極早生732号、春のかほりSP、春ひかり7号	9.28～10.2	10下～11上	5 上	～	5 中
	秋まき(6月どり)	{ ①秋蒔中早生3号、錦恋 ②中生SE、さつき女王	10.1～10.5 10.6～10.10	11上～11中	5 下	～	6 下
はくさい	秋まき (早生) (中早生) (中生・中晩生)	晴黄60	8 上	8 中 下	10 中	～	10 下
		黄ごころ65、黄楽70	8 中	8下～9上	10 下	11 上	11 中
		黄ごころ75、あきめき、晴黄75、冬月90	8 中	8下～9上	11 上	11 中	11 下
たまねぎ	秋まき	ネオアース、ケルたま、ターボ、スパート	9.10～15	10下～11上	5 下	～	6 下

※一部、商標名が掲載されています。

富山県山種野菜協会の
富山山種野菜協会の

作目	作型	適品種*	は種期 (月旬)	定植期 (月旬)	収穫(月旬)			
					始	盛	終	
レタス	春まき	レガシー、サウザー、オリンピア	3上~4下	4下~5下	6上中	~	7上	
	夏まき	サウザー、オリンピア	8中	9上	11上	~	12中	
	秋まき	フルバック、レガシー、サリナス88	9下	10下	5中	~	6中	
カリフラワー	春まき	しらたま5号	3上~4下	5上~6中	7上	~	7下	
	夏まき	{ ①里月 ②スノークラウン、オーナメントホワイト、美星(ミニ)	6下~7上	7下~8上	9下	~	10中	
			6下~7中	8上下	10上	~	12中	
ブロッコリー	春まき	おはよう、ピクセル、ハイツSP	3上~4上	4中~5上	6上	~	6下	
	夏まき	おはよう、ピクセル、ハイツSP	7中下	8上中	9下	~	11下	
だいこん	春まき	トマネルチ	3上~3下	-	5中	~	6上	
		トネル	3下~5上	-	5下	~	7上	
		露地	5中下	-	7中	~	7下	
	夏まき	準高冷地 カンレイシャル トネル	夏の翼、夏つかさ	7中~8中	-	9中	~	10中
			8上中	-	10上	~	10下	
秋まき		秋の翼、耐病総太り、豊秋、千都	8下~9中	-	10中	10下	12上	
かぶ	春まき	玉里、白鷹	3上~5下	-	4下	~	7上	
	夏まき	碧寿	6上~8下	-	7中	~	10上	
	秋まき	(中小かぶ)	碧寿、CRもちばな、玉里、雪牡丹	8下~9中	-	10中	~	12上
		(大かぶ)	京千舞、早生大蕪	8中~9下	-	10中	~	2下
		(赤かぶ)	あかくら、飛驒紅かぶ	8下~9中	-	10中	~	12中
にんじん	春まき	紅ひなた、紅うらら、向陽2号	3下~4中	-	6中	6下	7中	
	夏まき	{ ①愛紅、紅ひなた、向陽2号、アロマレッド ②彩誉	7下~8上	-	10中	11下	12中	
8下			-	11下	12上	12中		
ごぼう	春まき	てがる(サラダむすめ)、みとよ白肌、常盤	4上~6上	-	7下	~	11下	
しゅんぎく	春まき	さとゆたか	3中~5上	-	5中	~	6中	
	秋まき	さとゆたか	9下~10上	10中~11上	11中	~	3中	
直まき8下~10中			-	9下	~	3中		
こまつな	春まき	春のセンバツ、なつき、まさみ	3中~5下	-	4下	~	6下	
	夏まき	なつき、夏の甲子園、夏音、里きりり	6上~8下	-	7下	~	9下	
	秋・冬まき	冬里、あっちゃん(10月以前、2月以降の播種を避ける)、はまつづき、さくらぎ(10月、2月播種)	9上~3上	-	10上	~	4下	
みずな	春・夏・秋まき	京みぞれ	3中~10中	-	4下	~	11下	
	秋・冬まき	早生水天、京しぐれ	{ 11上~11下 2上~3上	-	12下 3中	~	2下 4中	
しろな	周年	(夏用)はまみなどべかな、大東京べかな	-	-	-	-	-	
なばな	夏秋まき秋冬どり	秋華、早陽1号	8下~9上	-	10上	~	12下	
	秋まき冬どり(施設)	冬華	9中~9下	-	1上	~	3中	
	秋まき春どり	ふきたち(在来種)	9上~9中	-	4中	~	4下	
にら	露地	ハイパーグリーンベルト、ワンダーグリーンベルト、エナジーグリーンベルト	3中~4中	6中~7上	翌年5下	~	10中	
アスパラガス	ハウス早熟	スーパーウェルカム、グリーンタワー	3下~4中	6下~7上	翌々年、4上	~	6上	
	普通	グリーンタワー、メリーフシントン500W	3下~4中	6下~7上	翌々年、4下	~	6下	
	立茎栽培	グリーンタワー	3下~4中	6下~7上	翌々年、5下	~	10中	
スイートコーン	普通	ゴールドラッシュ、ゴールドラッシュ86、わくわくコーン	4下~5中	-	7上	~	8下	
えんどう	春まき	スナック、スナック753	3上	-	5中	~	6中	
	秋まき	改良姫みどり、30日絹莢、スナック753、スナック	10下	-	5中	~	6中	
ふじまめ(千石)	早熟	芭蕉成ふじまめ	3中	4下	5下	~	10下	
いんげん	普通	さつきみどり2号、モロッコ(つるあり)	4下~6上	-	6上~7上	~	7中~8下	
	抑制	黒種衣笠(つるあり)、モロッコ(つるあり)	6中~7中	-	9上	~	10上	
えだまめ	普通	サッポロミドリ、湯あがり娘たんくろう(黒豆)、快豆黒頭巾(黒豆)	4中~5中	-	7中	~	8上	
さといも	早掘り	石川早生	(4上催芽)	4下	8下	~	9中	
	普通掘り	大和	(4上催芽)	4下	9下	~	11上	
ばれいしょ	春作	キタアカリ、男爵、メークイン、とうや	-	3下~4上	6下	~	7中	
	秋作	デジマ、農林1号	-	8中下	11上	~	11中	
かんしょ	普通	べにはるか、シルクスイート、ベニアズマ	-	4下~5下	8下	~	10下	

※一部、商標名が掲載されています。

令和5年度 新しく推奨品種に加えた品種の特性

キャベツ 恋舞（トーホク）

定植後70日程度で収穫可能な中早生の寒玉品種。気温が上昇する春まき初夏どりに特に適する。草姿は立性で揃いが良く、株の倒れが少ない。球色は濃緑で、尖り球になりやすく球形が安定する。裂球にも比較的強いいため加工向け出荷にも適する。萎黄病に強い。

キャベツ 錦恋（トーホク）

10月上旬まきで5月下旬頃から収穫が可能。球芯は短く、球の締まりが良い。球色は濃緑で尻部まで良く着色する。葉肉は厚く、歯切れが良い。萎黄病に強く、各種要素欠乏にも比較的強い。在圃性がやや低いため適期収穫に努める。

キャベツ さつき女王（日本農林）

10月上旬まきで6月上旬頃から収穫が可能な秋まき中早生品種。球形は扁円の寒玉タイプ。球色はツヤのある緑色で、加工向け出荷にも適する。草姿は立性で、外葉にややシワがある。軟腐病や尻腐れに比較的強い。在圃性に優れ、裂球は遅い。

たまねぎ スパート（タキイ）

晩抽の早生種。地上部の生育は旺盛で、草姿は立性、葉折れは少ない。抽苔や分球が少ない。肥大性、揃いが良く、収量性が高い。球形は早生種としては甲高。球の締まりが良いため、収穫や出荷時の傷みが少ない。

スイートコーン わくわくコーン™82（カネコ）

生育日数82日程度の早生イエロー品種。穂重は450g程度で大きくボリュームがある。先端稔性は良好。包被は濃緑。発芽、初期生育が良く、倒伏にも強い。食味は甘味が強く、コクのある濃い甘さで、粒皮も軟らかい。

スイートコーン わくわくコーン™88（カネコ）

生育日数88～90日程度の中晩生イエロー品種。穂重は450～500g程度で大きい。先端稔性は良好。包被は濃緑で先端露出になりにくい。発芽、初期生育が良く、倒伏にも強い。食味は甘味が強く、粒皮が軟らかい。抑制作型でも栽培可能。

富山県種苗協会会員名簿

市町村名	会員名	住所	電話	市町村名	会員名	住所	電話
富山市	(株)前田種苗店 ウェンディ	富山市婦中町西本郷 860-1	076 491-0030	朝日町	宇田種苗店	朝日町桜町99-1	0765 83-3354
高岡市	蔵野種苗店	高岡市佐野新町1252	0766 23-3289	射水市	(有)島種苗店	射水市戸破4226	0766 55-0542
	(株)増山商店	高岡市横田1丁目 3-24	0766 22-1948	南砺市	せがわ種苗店	南砺市福光7160	0763 52-0810
魚津市	松田商店	魚津市新金屋1丁目 5-28	0765 22-0254	小矢部市	中田農園	小矢部市高木出1088	0766 67-4487

接木用台木の推奨品種と特性

作目名	台木用品種	特 性
トマト	・ B バ リ ア (タキイ)	青枯病に特に強く、半身萎凋病、萎凋病(R1, 2, 3)、根腐萎凋病(J-3)、ネコブセンチュウに抵抗性がある。草勢は「影武者」「ベスパ」よりもおとなしい。穂木がタバコモザイクウイルス抵抗性遺伝子Tm-2及び、Tm-2 ^a 型品種に適する。
	・ キングバリア (タキイ)	青枯病に強く、褐色根腐病に強い耐病性を示すほか、TMV(Tm-2 ^a 型)耐病性、かいよう病、萎凋病(R1, 2, 3)、半身萎凋病(R1, 2)、根腐萎凋病(J-3)、サツマイモネコブセンチュウに複合耐病性を示す。茎が紫色で低温期の太りも良いため、接ぎ木作業が容易。根域が広く、発根力が旺盛で根量も多いため、穂木の草勢維持がしやすく、萎れにも強い。夏秋栽培や促成栽培、短期作から長期作まで周年で使用可能。
	・ かんばる根トリパー (愛三)	萎凋病(R1, 2, 3)抵抗性と強い青枯病耐病性を示す。その他、根腐れ萎凋病(J-3)、半身萎凋病、サツマイモネコブセンチュウ、TMV(Tm-2型)、アルタナリア茎枯病に抵抗性、褐色根腐病に耐病性を示す複合耐病性品種。根域はやや広く、草勢はおとなしいが持続力がある。根の再生力が強いので幅広い土壌条件に対応する。周年で使用可能。穂木がTMV抵抗性遺伝子Tm-2及びTm-2 ^a 型品種に適する。
きゅうり	・ ときわGT-II (ときわ)	発根力に優れ、地上部の生育や収穫始めがやや早く、栽培後半まで安定的に草勢を維持するため、収量性が高い。ウドンコ病耐病性を持ち、育苗期のウドンコ病の発生を抑制できる。周年でいずれの作型にも適するが、特に低温期の栽培に適する。
	・ ニュースーパー雲竜 (久留米)	ブルームレス台木で、低温伸長性、耐暑、耐寒性に優れ不良条件下でも草勢を維持できる。草勢は生育初期から強く初期～後期まで間断なく果実がなり続ける。
	・ ゆうゆう一輝 (埼玉原種)	子葉の形状はやや細長く、厚みがあり水平に展葉し垂れない。また、従来のブルームレス台木に比べ、胚軸が太く空洞は小さい。穂木とのは種間隔は、呼び接ぎの場合で穂木のは種日から1～2日後には種する。
	・ ときわパワーZ (ときわ)	ブルームレス台木で、ウドンコ病耐病性を持ち、育苗期や定植後のウドンコ病防除が低減できる。小規模キュウリ栽培に適する。
なす	・ 茄の命 (神田)	半枯病と半身萎凋病に抵抗性。青枯病には「茄の力」よりも強い耐病性を有する。育苗期間は、ややおとなしい生育を示すが、栽培中期～後期は草勢が旺盛になり、収量が増える。穂木より7～10日早蒔きし、割り接ぎの場合、本葉5～6枚展開時に、台木の本葉1～2枚の上位で接木する。挿し接ぎの場合、本葉2.5～3枚時に、台木の本葉1～2枚の上位で接木する。
	・ トルバム・ビガー	青枯病、半枯病、半身萎凋病、ネコブセンチュウなど土壌病害虫に対する複合抵抗性をもつ。耐湿性、耐暑性に優れ、草勢が強いため長期栽培に適する。発芽に時間を要するので注意する。
	・ 赤 虎 (タキイ)	半枯病(F)に耐病性で、青枯病(B)にもやや強い。耐暑性と低温性にすぐれ、特に低温期の枝伸びや果実肥大がよい。初期生育が早く、「赤ナス」よりも節間が長くて接ぎ木しやすい。
	・ 台 太 郎 (タキイ)	青枯病、半枯病に複合耐病性を持ち、特に青枯病に関しては強い圃場耐病性を示す。胚軸が太くて長く、直立して生育するため接ぎ木作業が容易。草勢は「赤ナス」よりやや強く、「トルバム・ビガー」よりおとなしい。
すいか	・ F R 長 寿 (大和)	青枯萎凋症に強い抵抗性をもつ。低温伸長性がよく、つるぼけしにくい。草勢が比較的強いので、基肥はやや控え目とし、中・後期の分施とする。
	・ FR-ヘコタレン (ナント)	つる割れ病に強く、耐暑性がある。草勢が比較的強いので、低温期作型においては施肥は基肥やや控えめで追肥主体とする。