

2025年 いきいき直売の会 アスパラガス(立茎栽培) 病害虫防除暦

月	旬	生育	殺菌剤	倍率	殺虫剤	倍率	葉面散布剤	除草剤 1a当り使用量 水10ℓ当り	適用病 害虫	
4	中下	萌芽前	ここまで耕種の防除 病気が多発なら ①ベンレート水和剤	2,000倍				トレファノサイド乳剤 20～30m l、1回のみ (雑草がまばらに生え ている場合は、バスタ 液剤 (使用回数2回) を混用散布する)		
5	上	春どり盛期								
	中				アーデント水和剤 (前日まで、2回以内)	1,000倍			オオタバコガ、 アブラムシ、カ メムシ類	
	下	立茎始め	①ユニフォーム粒剤 (前日まで、3回以内)	12kg/10a	立茎開始から防除を徹底 する。3日間隔で実施。 1mの高さまで。それ以 降は1週間間隔。				疫 病	
			②ベンレート水和剤 (前日まで、4回以内)	2,000倍					茎枯病、斑点 病、褐斑病	
		立茎中期	③ダコニール1000(液) (前日まで、4回以内)	1,000倍					茎枯病、斑点 病、褐斑病	
立茎完了		④コサイド3000 (D F) (使用回数制限なし)	2,000倍					茎枯病、斑点 病、褐斑病		
6	上	茎葉伸長期	ダコニール1000(液) (前日まで、4回以内)	1,000倍	ハチハチフロアブル (前日まで、2回以内)	1,000倍	メリット青 500倍 根っこりん 250倍 カルタス 500倍 (病害虫防 除薬剤に混 用散布す る)	茎枯病、斑点 病、褐斑病、ア ブラムシ、アサ ミウマ類 茎枯病、斑点 病、褐斑病、ア ブラムシ、アサ ミウマ類 茎枯病、斑点 病、褐斑病		
	中	開花・擬葉展開	アフエットフロアブル (前日まで、4回以内)	2,000倍	アフーム(乳) (前日まで、2回以内)	2,000倍				
	下		アミスター20 (F) ※ (前日まで、4回以内)	2,000倍						
7	上	夏どり始め	シグナムWDG (前日まで、2回以内)	1,500倍	モスピラン(顆粒水) (前日まで、2回以内)	4,000倍		茎枯病、斑点 病、褐斑病、ア ブラムシ、アサ ミウマ類 茎枯病、斑点 病、褐斑病		
	中		コサイド3000 (D F) (使用回数制限なし)	2,000倍						
	下		ダコニール1000(液) (前日まで、4回以内)	1,000倍	デルフィン顆粒水和剤 (前日まで、—)	1000倍			茎枯病、斑点 病、褐斑病、ヨ トウムシ、オオ タバコガ	
8	上	夏どり盛期 (※)	アフエットフロアブル (前日まで、4回以内)	2,000倍	ダントツ(水溶) (前日まで、3回以内)	2,000～4000倍		バスタ液剤 30～50m l、2回以内 雑草生育期萌芽前又は うね間処理 (収穫前日まで)	茎枯病、斑点 病、褐斑病、ヨ トウムシ、オオ タバコガ 茎枯病、斑点 病、褐斑病、ヨ トウムシ、オオ タバコガ ヨトウムシ、オ オタバコガ、カ メムシ類	
	中		ラリー水和剤 (前日まで、2回以内)	4,000倍	コテツフロアブル (前日まで、2回以内)	2,000倍				
	下				スピノエース(顆粒水) (前日まで、2回以内)	5,000倍				
				コサイド3000 (D F) (使用回数制限なし)	2,000倍					
9	上	夏どり後半	ダコニール1000(液) (前日まで、4回以内)	1,000倍	フェニックス顆粒水和剤 (前日まで、2回以内)	2,000～4,000倍	根っこりん 250倍 カルタス 500倍 (病害虫防 除薬剤に混 用散布す る)		茎枯病、斑点 病、褐斑病、ヨ トウムシ、オオ タバコガ 茎枯病、斑点 病、褐斑病、ア ブラムシ、アサ ミウマ類 茎枯病、斑点 病、褐斑病、オ オタバコガ、ア ブラムシ	
	中		コサイド3000 (D F) (使用回数制限なし)	2,000倍	ハチハチフロアブル (前日まで、2回以内)	1,000倍				
	下		アフエットフロアブル (前日まで、4回以内)	2,000倍	アーデント水和剤 (前日まで、2回以内)	1,000倍				
10	上	打ち止め	ベルクート水和剤 (収穫終了後、5回以内)	1,000倍				ブリグロックスL 60～100m l、3回以内 (収穫前日まで)	茎枯病	
	中	養分転流時期	ICボルドー66 (収穫終了後)	50倍					茎枯病	

【特記事項】

※アミスター20(F)には、展着剤は加用しない。

※8月下旬頃からの長雨による病害虫発生に備え、8月上旬からの防除を徹底する。

害虫対策	薬剤名	使用量	使用時期
カタツムリ類、ナメクジ類	スラゴ	1～5 g/㎡	発生時