

いきいき直売の会 令和7年 すもも(プラム・プルーン)栽培暦

◆すももには、プラム(日本すもも)とプルーン(西洋すもも)があり、下記こよみは両種に対応しています。

月	時期	対象病害虫	散布薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	年間使用回数	重点作業
1							<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">黒斑病対策</div> <p>防風ネット・防風垣</p> </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">結実安定対策</div> <p>人工授粉</p> </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">摘果 芽かき 傘かけ</div> </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">大石収穫期</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ソルダム 収穫期</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">貴陽 収穫期</div> </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">夏季 剪定</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">礼肥</div> </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">整枝・剪定</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">基肥 土づくり</div> </div> </div>
2	上中	(発芽前) カイガラムシ類・ハダニ類・越冬病害虫	石灰硫黄合剤(※注意)	10倍	発芽前	-	
		ふくろみ病	(展着剤を加用) または チオノックフロアブル トモノールS(★補足) (展着剤は加用しない)	140倍 500倍 20倍	- 14日前まで 発芽前	- 3回以内 -	
3	上	(発芽直前) かいよう病・黒斑病	ICゴールド-412	30倍	-	-	
	下	(落弁期) 灰星病 アブラムシ類・シンクイムシ類	ベルコート(水) アディオフロアブル	1000~2000倍 1500倍	3日前まで 前日まで	3回以内 2回以内	
4	上	黒斑病が発生しやすい品種は下記薬剤を散布する。 黒斑病 カイガラムシ類(幼虫)	マイコシールド アブロードフロアブル	2000倍 1000倍	21日前まで 14日前まで	3回以内 2回以内	
	下	灰星病 アブラムシ類	アミスター10フロアブル ウララDF	1000倍 2000~4000倍	前日まで 7日前まで	3回以内 2回以内	
5	上	カイガラムシ類・シンクイムシ類	モスピラン顆粒(溶)	2000倍	前日まで	3回以内	
	下	灰星病	スコア顆粒(水)	2000~3000倍	前日まで	2回以内	
6	中	灰星病	ナリアWDG	2000倍	前日まで	2回以内	
		シンクイムシ類	スカウトフロアブル	2000倍	前日まで	3回以内	
7	中	灰星病	ロブラール(水)	1000~1500倍	前日まで	3回以内	
		アブラムシ・シンクイムシ類	アディオフロアブル	1500倍	前日まで	2回以内	
8	中	カイガラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	前日まで	3回以内	
9							
10		黒斑病	ICゴールド-412	30倍	-	-	
11							
12							

※注意：石灰硫黄合剤とチオノックフロアブル及びトモノールSは混用しないこと。

★補足・トモノールSの代用として「キング95マシン」を希釈倍率：12~14倍で散布しても良い。

成木における施肥例(kg/1a)

肥料の種類	総量	基肥	追肥	礼肥
		11~12月	3月	8~9月
BM有機果樹専用	9	9		
果樹専用1号	5		3	2
苦土石灰	12	12		

1~3年生は上記の2割程度、4~6年生は上記の6割程度とする。

土づくり 基準設計(kg/1a) 10月~12月

肥料の種類	施用量
完熟堆肥	200
BMようりん	6
FTE	0.6

定植年(植付前)は、上記肥料に加え苦土石灰14kgを施用する。