

水稲情報

— 第7号 —

今後、近年並みの天候で推移すると、5月5日植の「てんたかく」の幼穂形成期は6月22日頃になると予想されます

- 1 中干しを確実にするため、溝の手直しを実施しましょう。
- 2 ほ場を見回り、雑草が見られた場合は、遅れずに除草剤を散布しましょう。

特に、田植え直後に田面が見られたほ場、昨年雑草が多発したほ場。

具体的なデータ

6月11日の調査結果

	田植日 (月/日)	草丈 (cm)	茎数 (本/m ²)	葉齢 (葉)	葉色 (葉色板)	幼穂形成期 (月/日)	
てんたかく	本年	5/5	30.9	412	9.9	4.3	(6/22)
	昨年	5/4	36.0	470	9.4	4.5	6/23
	平年	5/3	34.7	461	9.3	4.6	6/24
コシヒカリ	本年	5/15	27.2	275	7.5	4.3	-
	昨年	5/16	31.4	246	7.3	4.2	7/11
	平年	5/14	31.5	280	7.9	4.2	7/11
富富富	本年	5/18	26.2	158	7.2	4.3	-
	昨年	5/18	26.3	214	6.9	4.3	7/12
	平年	5/12	28.5	320	7.8	4.5	7/10

てんたかくで、分施の方は、穂肥の施用が遅れないよう、準備してください。